

Data badania godzina

Skierowanie dostarczyć do dnia

Data doręczenia skierowania

KOLONOSKOPIA

– przygotowanie do badania z preparatem FORTTRANS

Co to jest kolonoskopia?

Kolonoskopia - metoda badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego polegająca na oglądaniu wnętrza jelita grubego. Wprowadza się przez odbyt specjalny wziernik zakończony kamerą i przesyła obraz na zewnątrz. Do tego celu służy giętki instrument zwany kolonoskopem, który jest zbudowany podobnie jak gastroskop służący do diagnostyki górnego odcinka przewodu pokarmowego. Podczas kolonoskopii możliwe jest też pobieranie wycinków błony śluzowej jelita grubego do badań histopatologicznych, a także wykonanie drobnych zabiegów, np. usuwanie pojedynczych polipów.

Jak wygląda badanie?

W czasie badania pacjent leży na lewym boku. Przed badaniem podaje się dożylnie środki znieczulające w celu złagodzenia nieprzyjemnych odczuć w trakcie badania. Giętki endoskop wprowadza się przez odbyt do jelita grubego i w czasie badania wdmuchuje się powietrze, aby lepiej uwidocznić ścianę jelita, co może być powodem nadmiernego oddawania gazów i dyskomfortu. Badanie trwa około 15-30 minut. Czasami w trakcie badania pobierane są wycinki - co jest bezbolesne. Wyniki badania histopatologicznego gotowe są do odbioru w rejestracji placówki po około 6-8 tygodniach od dnia wykonanego badania/zabiegu.

UWAGA!

Po badaniu wykonanym w znieczuleniu dożylnym nie wolno prowadzić samochodu ani obsługiwać innych pojazdów mechanicznych. Wskazana jest obecność osoby towarzyszącej.

Informacje ogólne

Osoby zażywające leki wpływające na krzepliwość krwi (np. Acard, Polocard, Polopirynę, Acenocumaryl, Sintrom, Varfin itp.) powinny wcześniej KONIECZNIE skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Pacjenci przyjmujący leki ratujące życie powinni w dniu badania zażyć te leki wg stałych, ustalonych dawek. Osoby chorujące na cukrzycę powinny poinformować o tym rejestrację naszej placówki.

Bezpośrednio przed badaniem (10-15 minut przed ustaloną godziną badania) prosimy o zgłoszenie się najpierw do rejestracji celem uzupełnienia formalności.

Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.

Schemat przygotowania do kolonoskopii:

5 dni przed planowanym badaniem/zabiegiem:

NIE NALEŻY spożywać sałatek jarzynowych, owoców pestkowych (np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek), maku, siemienia lnianego oraz pieczywa z całymi ziarnami zbóż.

NALEŻY w ciągu dnia dużo pić.

3 dni przed planowanym badaniem/zabiegiem:

ZAŁECA SIĘ spożywanie wyłącznie małych posiłków przygotowanych z żywności ubogoresztkowej (ser kremowy, twarożek, jajka gotowane na miękko, chleb pszenny).

2 dni przed planowanym badaniem/zabiegiem:

OBOWIĄZUJE ŚCISŁA DIETA PŁYNNA!

W celu zapewnienia właściwego nawodnienia organizmu należy pić niegazowaną wodę lub inne klarowne płyny (słaba herbata, soki - np. jabłkowy, czysty bulion, klarowny kisiel - w kolorze innym niż czerwony).

W dniu badania/zabiegu:

NIE WOLNO JEŚĆ, a można pić jedynie wodę niegazowaną.

Preparat **FORTTRANS** przyjmuje się w dwóch dawkach (4 saszetki)

Jeżeli badanie jest w godzinach porannych (do godz. 10:00)

Pierwsza dawka: dzień przed badaniem, godz. 14:00

Krok 1 – Wsypać zawartość 2 saszetek do 2 litrów chłodnej wody przegotowanej lub mineralnej niegazowanej.

Krok 2 – Dokładnie wymieszać.

Krok 3 – Płyn wypić do godz. 16:00.

Druga dawka: dzień przed badaniem, godz. 19:00

Krok 1 – Wsypać zawartość 2 saszetek do 2 litrów chłodnej wody przegotowanej lub mineralnej niegazowanej.

Krok 2 – Dokładnie wymieszać.

Krok 3 – Płyn wypić do godz. 21:00.

Jeżeli badanie jest w godzinach porannych (po godz. 10:30)

Pierwsza dawka: dzień przed badaniem, godz. 16:00

Krok 1 – Wsypać zawartość 2 saszetek do 2 litrów chłodnej wody przegotowanej lub mineralnej niegazowanej.

Krok 2 – Dokładnie wymieszać.

Krok 3 – Płyn wypić do godz. 18:00.

Druga dawka: w dniu badania, godz. 5:00

Krok 1 – Wsypać zawartość 2 saszetek do 2 litrów chłodnej wody przegotowanej lub mineralnej niegazowanej.

Krok 2 – Dokładnie wymieszać.

Krok 3 – Płyn wypić do godz. 7:00.

WAŻNE!

Należy zabrać wyniki z wykonywanych dotychczas badań endoskopowych

– np. gastrokopii, kolonoskopii