

ŚWIADOMA ZGODA NA WYKONANIE GASTROSKOPII

Imię, nazwisko i wiek chorego

PESEL tel.:

Adres

Stwierdzam, że przedstawiłem pacjentowi planowany sposób leczenia zabiegowego oraz poinformowałem o możliwych zagrożeniach i powikłaniach, które mogą wystąpić w przebiegu lub w wyniku badania.

.....
podpis i pieczęć lekarza

Właściwą odpowiedź należy zakreślić w kółko.

1	Czy w przypadku skaleczeń lub po usunięciu zębów występowały obfite krwawienia/krwotoki?	TAK	NIE
2	Czy przyjmuje Pan/Pani leki wpływające na krzepliwość krwi (np. Acard, Polocard, Acenocumarol, Aspiryna, itp.)?	TAK	NIE
3	Czy występowały objawy uczulenia (np. wysypka, świąd, duszności) po lekach (np. Lignocaine) lub rentgenowskich środkach kontrastowych?	TAK	NIE
4	Czy występują objawy choroby serca lub płuc, np. nadciśnienie tętnicze, zawał, arytmia, astma oskrzelowa lub inne? Jeśli TAK, proszę wymienić jakie.	TAK	NIE
5	Czy występują przewlekłe choroby: padaczka lub gruźlica?	TAK	NIE
6	Czy chorował/a Pan/Pani na żółtaczkę zakaźną?	TAK	NIE
7	Czy występuje choroba oczu - jaskra?	TAK	NIE
8	Czy przeżył/a Pan/Pani zabiegi operacyjne w obrębie jamy brzusznej i/lub operacje kardiochirurgiczne? Jeśli TAK, proszę wymienić jakie oraz wskazać rok:	TAK	NIE

BIOPSJA

Jeżeli podczas badania zostanie pobrany materiał do badania histopatologicznego, wynik będzie do odbioru w rejestracji placówki po około 6-8 tygodniach. Można go odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

UWAGA!

Wynik zostanie wydany osobie wskazanej, jeżeli w momencie jego odbioru okaże swój dokument tożsamości i pisemne upoważnienie.

DOTYCZY PACJENTÓW WYKONUJĄCYCH BADANIE W RAMACH NFZ

Czy obecnie jest Pan/Pani w trakcie leczenia szpitalnego?	TAK	NIE
Czy posiada Pan/Pani ubezpieczenie zdrowotne?	TAK	NIE

Zgadzam się na ewentualne zmodyfikowanie sposobu zabiegu w niezbędnym zakresie, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej, jeśli będzie tego wymagała sytuacja powstała w wyniku procesu terapeutycznego. Stwierdzam, że uzyskałem/am wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania i proszę o wykonanie proponowanego zabiegu.

Wszelkie moje wątpliwości dotyczące celu i sposobu przeprowadzania badania zostały wyjaśnione w trakcie rozmowy z lekarzem prowadzącym. Uzyskałem/am zadowalającą odpowiedź na wszystkie pytania. Wyrażam zgodę na zabieg endoskopowy, o jego przebiegu i możliwych powikłaniach zostałem/am poinformowany/a.

Oświadczam jednocześnie, że miałem/am nieskrępowaną możliwość zadawania pytań dotyczących planowanego badania, związanego z nim ryzyka i możliwości wystąpienia powikłań oraz uzyskałem/am zrozumiałe dla mnie, wyczerpujące odpowiedzi.

Zgodę wyrażam po podjęciu samodzielnej decyzji.

Oświadczam także, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i nie zataiłem/am żadnych istotnych informacji o stanie mojego zdrowia, przebiegu dotychczasowego leczenia czy przyjmowanych leków, będąc świadomym/ą wynikających z tego faktu ewentualnych konsekwencji zdrowotnych.

Potwierdzam zapoznanie z informacją o monitorowaniu wizyjnym w pomieszczeniach Radimed Sp. z o.o.

- na co wyrażam zgodę.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji procesu leczniczego.

.....
data

.....
czytelny podpis pacjenta

CO TO JEST GASTROSKOPIA:

Gastroskopia jest to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego pozwalające na ocenę błony śluzowej dwunastnicy, żołądka i przełyku. Pacjent przed wykonaniem musi pozostawać przez 6 godzin na czczo. Gastroskopia jest metodą diagnostyczną oceniającą części przewodu pokarmowego. Dodatkowo w razie potrzeby istnieje możliwość pobrania wycinków celem stwierdzenia obecności *Helicobacter pylori*, bakterii odpowiedzialnej za stan zapalny żołądka lub też oceny mikroskopowej w przypadku stwierdzenia wrzodu żołądka, polipa lub innych zmian, co ma zasadnicze znaczenie dla wyboru późniejszych metod leczenia. Badanie jest przeprowadzane zwykle w pozycji leżącej na lewym boku.

Z powodu miejscowego znieczulenia gardła nie wolno przez 15 min. po badaniu jeść ani pić, aby uniknąć zachłyśnięcia lub zadławienia. Proszę także informować lekarza, jeśli w ciągu kilku godzin będziecie Państwo odczuwać silne bóle jamy brzusznej, bądź zaobserwujecie czarny stolec. Również wystąpienie innych niejasnych dla Pana/Pani objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarkie lub lekarzowi. Proszę pytać, jeżeli czegoś Państwo nie rozumiecie lub chcecie wiedzieć więcej na temat badania.

PRZEPROWADZENIE BADANIA:

Wcześniej należy usunąć ewentualne protezy zębowe. Po miejscowym znieczuleniu gardła za pomocą Lidokainy w aerozolu pielęgniarka zakłada między zęby ustnik (dla ochrony delikatnego instrumentu). Następnie wprowadza do jamy ustnej i gardła gastroskop o średnicy 1 cm, prosząc jednocześnie o wykonanie ruchu połykowego. Moment ten może być nieprzyjemny i dawać uczucie duszenia: wymaga współpracy pacjenta z lekarzem wykonującym badanie. Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego trwa zwykle kilka minut, jest w niewielkim stopniu nieprzyjemne, ale w zasadzie bezbolesne, podobnie jak pobieranie wycinków. Instrument służący do badania jest każdorazowo dezynfekowany, dlatego też zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe. Wycinki błony śluzowej pobiera się sterylnymi szczypcami, co również zabezpiecza przed zakażeniem.

MOŻLIWE POWIKŁANIA:

Powikłania po gastroskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Niemniej jednak pewnego powodzenia tego badania, jak również jego absolutnego bezpieczeństwa, nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Wyjątkowo może nastąpić przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego (zwłaszcza przełyku w ok. 0.05 % badań). Bardzo rzadko może dojść do krwawienia po pobraniu wycinków. Powikłania takie zwykle nie wymagają leczenia operacyjnego. Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów i narządów.