

Preparat należy przyjmować zgodnie z zaleceniem we wskazanych w poniższej tabeli godzinach.

PAMIĘTAJ! Aby lek zadziałał musisz wypić pełną dawkę leku (roztwór + wodę). Normalną reakcją w czasie przygotowania się do kolonoskopii jest wypróżnianie (biegunka), pod koniec samą treścią płynną (woda). **Wypicie mniejszej ilości roztworu może spowodować niewystarczające oczyszczenie jelita oraz konieczność wykonania powtórnego badania.**

Sprawdź, o której godzinie masz badanie, a dowiesz się, kiedy rozpocząć przyjmowanie pierwszej i drugiej dawki leku EZICLEN*

Godzina badania	Godzina przyjęcia I dawki	Pierwsza dawka preparatu EZICLEN	Godzina przyjęcia II dawki	Druga dawka preparatu EZICLEN
08:00	20:00	1.Otworzyć jedną butelkę i wlać zawartość leku Eziclen do dołączonego kubka. 2. Dolać wody do leku do wysokości kreski zaznaczonej na kubku. 3. Bez pośpiechu (w ciągu pół godziny do godziny) wypić całość płynu z kubka. 4. Wypić trzy kolejne kubki wody lub klarownego płynu. Za każdym razem napełnić kubek wodą lub czystym płynem do kreski.	04:00	1.Otworzyć jedną butelkę i wlać zawartość leku Eziclen do dołączonego kubka. 2. Dolać wody do leku do wysokości kreski zaznaczonej na kubku. 3. Bez pośpiechu (w ciągu pół godziny do godziny) wypić całość płynu z kubka. 4. Wypić trzy kolejne kubki wody lub klarownego płynu. Za każdym razem napełnić kubek wodą lub czystym płynem do kreski.
09:00	21:00		05:00	
10:00	22:00		06:00	
11:00	22:00		07:00	
12:00	22:00		08:00	
13:00	05:00		09:00	
14:00	05:00		10:00	
15:00	05:00		11:00	
16:00	06:00		12:00	
17:00	07:00		13:00	
18:00	08:00		14:00	

***Dawkowanie jest podzielone na wieczór lub noc dnia poprzedzającego badanie oraz poranek lub południe w dniu badania.**

Po wypiciu płynów ze środkiem przeczyszczającym nie wolno przyjmować już żadnych pokarmów stałych ani płynów.

Prosimy poinformować swojego lekarza rodzinnego lub lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach i skonsultować z nim czy w dniu badania można przyjąć leki.

Szanowni Państwo!

W trosce o należyte przygotowanie jelita grubego do badania prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do poniższych zaleceń.

DIETA PRZED KOLOSKOPIĄ:

3 DNI PRZED BADANIEM : nie jeść owoców zawierających drobne pestki (np. winogrono, kiwi), pieczywa z nasionami (np. słonecznika, siemienia lnianego) i tym podobnych.

2 DNI PRZED BADANIEM : dieta ubogo resztkowa – ryż, makaron, bulion, białe pieczywo, gotowane mięso i ryby, chuda wędlina, jajka, przecedzone , klarowne soki, herbata i inne niegazowane napoje.

1 DZIEŃ PRZED BADANIEM : ok **godz. 8:00** lekkostrawne śniadanie- białe pieczywo, jajko, chuda wędlina, herbata, klarowne soki, woda. Około **godz. 15:00** kisiel lub galaretka bez owoców.

Po godzinie 15:00 NIE MOŻNA NIC JEŚĆ! Można ssać landrynki, pić dużą ilość wody niegazowanej, przeźroczystych soków, herbaty.

Należy zastosować lek przeczyszczający EZICLEN.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU EZICLEN (opakowanie zawiera 2 butelki + kubek)

PIERWSZA DAWKA (patrz godzina wg tabeli)

Jedną butelkę leku Eziclen wlej do kubka, który znajduje się w pudełku. Następnie należy dolać niegazowaną wodę do zaznaczonej na kubku podziałki (razem będzie 0,5l roztworu) – wypij (pij około pół godziny małymi łyčzkami).

Następnie (w ciągu 1 godziny) wypij dodatkowy 1,5 litra wody niegazowanej, można do wody wcisnąć cytrynę. Uwaga – **wodę zacznij pić zaraz po wypiciu leku.**

DRUGA DAWKA (patrz godzina wg tabeli)

Postępuj dokładnie tak samo jak przy pierwszej dawce.